

徐氏醫學十六種

6
E Chinese

Vol. VI

蘭臺軌範卷二

吳江徐靈胎河漢著

風

靈素

素問風論黃帝問曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癰風或為偏枯或為風也其病各異其名不同或內至五臟六腑不知其解願聞其說岐伯對曰風氣藏於皮膚之間內不得通外不得泄風者善行而數變滕理開則灑然寒閉則熱而悶其寒也則衰食飲其熱也則消肌肉故使人悵慄而不能食名曰寒熱風氣與陽明入胃循脈而上至目內眦其人肥則風氣不得外泄則為熱中而目黃人瘦則外泄而寒則為寒中而泣出風氣與太陽俱入行諸脈俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤悶而有瘍衛風有所凝而不行故其肉有不仁也癰者有榮氣熱腑其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脈而不去名曰癰風或名寒熱以春甲乙傷於風者為肝風以夏丙丁傷於風者為心風以季夏戊己傷於邪者為脾風以秋庚辛中於邪者為肺風以冬壬癸中於邪者為腎風風中五臟六腑之俞亦為臟腑之風各入其門戶所中則為偏風風氣循風府而上則為腦風風入係頭則為目風眼寒飲酒中風則為漏風入房汗出中風則為內風新沐中風則為首風久風入中則為腸風飧泄外在腠理則為泄風故風者百病之長也至其變化乃為他病也肺風之狀多汗惡風色鮮然白時欬短氣晝日則差暮則甚其診在眉上其色白心風之狀多汗惡風焦絕善怒噦赤色病其則言不可快診在口其色赤肝風之狀多汗惡風善悲色微倉噦乾善怒時憎女子診目下其色青脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃腎風之狀多汗惡風面龐然浮腫脊痛不能正立其

色照隱曲不利診在肌上其色黑胃風之狀頭多汗惡風食飲不下膈塞不通腹善滿失衣則腹脹食寒則泄診形瘦而腹大首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出納至其風日則病少愈漏風之狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風衣常濡口乾善渴不能勞事泄風之狀多汗汗出泄衣上口中乾上漬其風不能勞事身體盡痛則寒諸風病狀各殊其多汗惡風同傷風畏風辨症斷不至誤治也平人氣象論面腫曰風

風厥勞風 評熱病論岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥氣逆其即名風厥帝

曰願卒聞之岐伯曰巨陽生氣故先受邪少陰與其為表裏也得熱則上從之從之則厥也必少陰之氣

帝曰治之奈何岐伯曰表裏刺之飲之服湯帝曰勞風為病何如岐伯曰勞風法在肺下其為病也使人

強上冥視唾出若涕惡風而振寒此為勞風之病帝曰治之奈何岐伯曰以救俛仰巨陽引精者三日中

年者五日不精者七日效出青黃澤其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死也此等

病最當體認若認為肺癰肺痿則失之遠矣蓋肺癰乃肺痿癰此則風寒入肺痰涎凝結也

酒風 病能論帝曰有病身熱解墮汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名曰酒風

偏枯 生氣通天論汗出偏沮使人偏枯

痺 靈樞熱病篇之為病身無痛者四肢不收智亂不甚其言微知可治甚則不能言不可治也

金匱

夫風之為病常半身不遂或但臂不遂者此為痺脉微而數中風使然寸口脉浮而緊緊則為寒浮則

為虛寒虛相搏邪在皮膚浮為血虛絡脉空虚賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急病在機處故外治必塗其緩者

正氣引邪喝僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言

口吐涎之辨證寸口脉遲而緩遲則為寒緩則為虛緊緩則為亡血衛緩則為中風邪氣中經則身癢而癢疹心氣不足邪氣入中則胸滿而短氣

傷寒論

脉浮而大浮為風虛大為氣強風氣相搏必成癰疹身體為瘡瘡者名泄風久風為痼癰

病源

風癢風邪之氣若先發於陰病發於五臟者其狀奄然不知人喉裏噎噎然有聲舌強不能言發汗身軟者可治眼下及鼻人中左右上白者可治黑赤吐沫者不可治汗不出體直者七日死

口噤諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并絡入頰頰夾於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤不開也證其脉遲者生

舌強脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也

賊風冬至之日有疾風從南方來名曰虛風其傷人也但痛不可按抑轉動傷風冷則骨解深痛按之乃應骨痛也但覺身內索索冷欲得熱物慰痛處即小寬時有汗久不去重遇冷氣相搏結成瘰癧及偏枯遇風熱相搏乃變附骨疽也附骨疽亦由風冷所致

風痙口噤不開背強而直如發癰之狀其重者耳中策策痛卒然身體痙直者死也由風邪傷於太陽經復遇寒濕則發痙也此與病後壞證之痙不同

角弓反張風邪傷人令腰背反折不能使仰似角弓者由邪入諸陽經故也

柔風血氣俱虛風邪并入在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急柔風之狀四肢不能收裏急不能仰不仁由榮氣虛衛氣實風寒入於肌肉使血氣不宣流其狀搔之皮膚如隔衣是也

風驚悸 由心氣不足心府為風邪所乘則驚不自安悸動不定其狀目精不轉而不得呼

刺風 由體虛膚腠開為風所侵如刀錐所刺也

蠱風 由體虛受風其風在於皮膚淫淫躍躍若蟲若刺一身盡痛侵傷氣血其動作如蠱毒也

鬚眉墮落 皆由風濕冷得之邪客於經絡與血氣相干使榮衛不和故面色敗皮膚傷鼻柱壞鬚眉落

此乃癰風也

惡風 風病有四百四種總不出五種黃風青風赤風白風黑風人身有八萬尸蟲若無八萬尸蟲人身不成不立復有諸惡橫病諸風害人所謂五種風生五種蟲能害於人

口喝 養生方云夜臥當耳勿得有孔風入耳中喜食口喝口喝見金匱此又是一病當內服藥而外提出風邪

外臺

風猥退 四肢不收身體疼痛肌肉虛滿骨節懈急腰脚緩弱由分肉流於血脉久成風水之病

譚曳 肢體弛緩不收攝也人以胃氣養肌肉經脈胃氣衰損則經脈虛而肌肉懈惰故風邪搏於筋而使譚曳也

風毒發 眼疼脚縱中指痠連肘邊心裏悶肋脹少氣喘氣欲絕不能食

風方

酒風 治身熱懈惰汗出如浴惡風少氣

澤瀉

本名十廉衛五分合以三指撮為後飯廉衛即廉衛一名無心草南人呼為吳風草味苦平微寒主治風濕三指為一撮約二三錢飯後藥

先為後飯按廉衛類即鹿啣草為後飯服在飯後非飯前也凡古方須將神農本草細參藥性乃能深知其義

侯氏黑散金匱 治大風四肢煩重心中惡寒不足者

菊花四十 白朮十分 細辛三分 茯苓三分 牡蠣三分 桔梗八分 防風十分 人參 礬石各三

黃芩五分 當歸 乾薑 芎藭 桂枝各三 右十四味杵為散酒服方寸匕日一服初服

二十日溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷服六十日止即藥積在腹中不下也熱食即下寒食自能助藥力腸腹空虛則邪易留此項滿安陳說和氣不能容

風引湯金 除熱癰瘡 巢氏云脚氣宜風引湯

大黃 乾薑 龍骨各四 桂枝三兩 甘草 牡蠣各二 寒水石 滑石 赤石脂

白石脂 紫石英 石膏各六 右十二味杵粗篩以韋囊盛之取三指撮并花水三升煮三

沸溫服一升此乃臟腑之熱非草木之品所能散故以金石重劑清其裏

防己地黃湯金 治病如在狀妄行獨語不休無寒熱其脈浮

防己一分 桂枝 防風各二 甘草一分 右四味以酒一杯浸之一宿絞取汁生地黃二斤以咀

蔡之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服此方他藥輕而生地獨重乃治血中之風也此等法最宜細玩凡風勝則燥又風能發

火故治風藥中無純用燥熱之理

頭風摩散金 大附子一枚 鹽等分 右二味為散沐以方寸匕已摩拭上令藥力行

越婢湯金 風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大汗者主之

麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩 甘草二兩 大棗十五枚 右五味以水六升先煮麻黃去上沫納諸藥

煮取三升分溫三服惡風加附子一枚本方加白朮四兩即越婢加朮湯越婢寒散之方也治風熱在表之證

小續命湯金 治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能言吞卷忽忽精神悶亂諸風服之皆驗

麻黃 防己 人參 黃芩 桂心 芎藭 甘草 川芎 杏仁各一

防風一兩半 附子一枚 生薑五兩

右十二味咀咀以水一斗二升。先煮麻黃三沸。去沫。納諸藥。煮取

三升。分三服。不瘥。更合三四劑。隨人風輕重虛實。脚弱服之。亦瘥。恍惚者。加茯苓。遠志。骨節疼痛。有熱

者。去附子。倍芍藥。外臺加白朮一兩。石膏當歸各二兩。無防己續命為中風之主方。因證加減。變化由人。而總不能舍此。以立法。後人不知此。

義人自為說。流弊無窮。而中風一證。遂十不愈一矣。人參附桂。何嘗不用。必實見其有寒象。而後可加。然尤宜於西北人。若東南人。則當詳審。勿輕試。

錄驗續命湯 治中風。非身體不能自收。口不能言。胃味不知。痛處或拘急。不得轉側。

麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏 乾薑 甘草各三兩 川芎 杏仁四十枚 右

九味。以水一斗。煮取四升。溫服一升。當小汗。薄覆。着。憑几坐。汗出則愈。不汗。更服。無所禁。勿當風。并治

但伏不得臥。咳嗽逆上氣。面目浮腫。虛而感風。則成非此治。痺證之主方。

近效求附湯 治風虛頭重眩苦極。不知食味。暖肌補中益精氣。

白朮二兩 附子一枚半 泡去皮 甘草一兩 右三味。剉。每五錢。薑五片。棗一枚。水益生煎。七分。去滓。溫服。

此治中風後。陽虛之證。按古今錄驗。近效二種。乃唐以前之方。書今全本。未見外臺中。引二書之方。極多。金匱要略。宋人校書。若往往以本集。中載方太少。故亦採取。不書。并千金外臺之外。釋其精要者。如附一二方。於每病之後。而方首亦必不沒其所本之書。古人之不若如此。今人見其方載入金匱中。即以爲仲景所定之方。誤矣。須知之。

地黃煎干 治熱風心煩。胸及脾胃間熱。不下食方。

生地黃汁 枸杞根汁各二兩 生薑汁 酥各三升 荆瀝 竹瀝各五升 天門冬 人參各八兩

茯苓六兩 大黃 梔子各四兩 右十一味。搗篩。五物為散。先煎地黃等汁。成膏。納散攪勻。每服一

匕。日再。漸加至三匕。覺利。減風行。必燥。古人治風。必用潤藥。乃真訣也。今

三黃湯針 治中風手足拘急。百節疼痛。煩熱。心亂。惡寒。經日不欲飲食。

麻黃五分 獨活四分 細辛 黃耆各二兩 黃芩三分 右五味。以水六升。煮取二升。分溫三服。一服

小汗二服大汗。心熱加大黃二分。腹滿加枳實一枚。氣逆加人參三分。悸加牡蠣三分。渴加括萎根三分。先有寒加附子一枚。此方專以驅風為治

風痺方針 治手足不遂癱直 伏龍肝五升為末。冷水八升攪取汁飲之。能盡為善。

治半身不遂方針 蠶沙兩石熟熬。分作直袋三枚。熱盛一袋著患處。如冷換熱者數易之。瘥後須羊肚

釀糯米葱白薑椒豉等爛煮熱喫。日食一具。十日止。按此法製痺證亦良

治風懿方 竹瀝一升 治半身不遂手足拘急身冷強直不語或狂言角弓反張或食或不食或大小

便不利。治風懿之法與治風痺之法不相遠

口眼喎僻方 治中風面目相引偏僻牙車急舌不轉

牡蠣熬 礬石燒 附子泡去皮 伏龍肝等分 右四味搗篩為散。以三歲雄雞血和藥敷上。預候看。

勿令太過。偏右塗左。偏左塗右。正則洗去之。又方大皂莢五兩去皮子 搗篩以三年大醋和塗緩處。

又方千金 治風著人面引口偏著耳牙車急舌不得轉

生地黄汁 竹瀝各一獨活 右三味合煎取一升頓服之即愈。此風舒經活血

開心肥健方千金

人參五兩 大猪肪八枚 右二味搗人參為散猪肪煎取凝每服以人參一分猪脂十分以酒半升

和服之。一百日骨髓充益。日記十言。身體潤澤。去熱風冷風心頭等風。月服二升半即有大效。此方治老人及

風燥者最宜

一切風虛方千金

杏仁九升去尖及兩仁曝乾 右一味搗為末以水九升研濾如作粥法緩火煎令如麻浮上。是取和薑粥酒

內一匙服之。每食即服。不限多少。服七日後。大汗出。二十日後汗止。慎風冷。猪魚雞蒜大醋一劑。後諸風減。差。春夏惡酸少作服之。秋九月後煎之。此法神妙。可深秘之。此即作杏酪之法。服食最宜。

竹瀝湯外臺 治諸中風

竹瀝二升 生薑根一升按亦當用汁 生薑汁三合

右三味分三服。日三。此通經絡之法。

卒不得語方外臺

以苦酒煮芥子薄頸一周。以衣包之。一日一夕。乃解瘥。

中風不語方寶鑑

取龜尿點石。取龜尿法。置龜於新荷葉上。以猪髮鼻內戳之。立出。

地黃飲子明

治中風舌瘡不能言。足廢不能行。此少陰氣厥不至。名曰風痺。急當溫之。

熟地

山茱萸

五味子

茯苓酒浸

石斛

麥冬

石菖蒲

遠志

茯苓

桂心

附子炮

已戟去心 薄荷文華

右十三味。每服三錢。生薑五片。棗一枚。煎服。風氣甚而

者忌服。此治少陰氣厥之方。所謂類中風也。故全屬補腎之藥。庸醫不察。竟以之治一切中風之證。輕則永無愈期。甚則益其病而致死。醫者病家終身不悟也。

稀涎散局方

治中風牙關緊急。并治單蛾雙蛾。

江子仁

六粒

牙皂三錢 明礬一兩

右先化開礬。入二味待礬枯。為末。每用二分。吹入喉中。此急救喉之法。

喉之法

稀涎丸本事

治口眼喎斜。偏風失音。不語時時吐涎。久服并眼目清明。髭鬚烏黑。筋骨強健。

稀涎

五月中取葉及嫩枝。洗九蒸。九曬。微焙。為末。煉蜜丸。桐子大。溫酒或米飲下。三四十丸。余按

發滯汁。熱膏打末。為丸。尤有力。此緩治之劑。非一時救病之法。

控涎丹三因

甘遂

大戟

白芥子等分

右為末。煮糊。丸。桐子大。曬乾。臥時。淡薑湯。或熱湯下。五七丸。至

十九此乃下痰之方人

將痰散治中風痰迷心竅舌強不能言

南星治中風痰迷心竅舌強不能言

茯苓各二錢橘紅一錢石菖蒲

人參各二錢竹茹七分甘草五分

右九味加薑五片水煎服此治心經之痰

勝金丸治中風忽然昏倒若醉形體冷悶四肢不收風涎潮於上膈氣閉不通

生薄荷半兩猪牙皂角二兩處浸取汁研成膏瓜蒂末一兩藜蘆二兩硃砂五錢

右將硃砂末二

分與二味研勻用膏子搗和丸如龍眼大以硃砂一分為衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐為度得吐

即醒不醒者不治實見其痰在上膈則可用石

銀液丹治諸風痰涎纏結心膈滿悶頭痛目運面熱心忪痰唾稠黏精神昏憤及風涎潮搐並宜服

之

天南星三分為末硃砂半兩鐵粉

水銀各三兩膩粉一兩黑鉛塊十遍秤三兩與水銀結砂為水

右研勻麵糊丸梧桐子大每服二丸同薑荷葉湯下生薑湯亦可微為度食後服如治風癰不計時候

服此方藥之使下通宜施治全在辨證之確

癰風方治眉落鼻壞偏體生瘡出神仙感遇傳

角刺一二升大黃九蒸

右為末再煎大黃湯服方寸匕旬日即愈

青州白圓局方見

瘰癧節

靈素

靈周痺論黃帝曰願聞衆痺岐伯對此各在其處更發更止更居更起以右應左以左應右非能周也
更發更休也帝曰善願聞周痺何如岐伯對曰周痺者在於血脉之中隨脉以上隨脉以下不能左右各
當其所帝曰善此痛安在何因而有名岐伯對曰風寒濕氣客於外分肉之間迫切而為沫沫得寒則聚
聚則排分肉而分裂也經中無痺字分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺
發發則如是此內不在臟而外未發於皮獨居分肉之間真氣不能周故曰周痺

深痺 九鍼十二原篇八風傷人內含於骨解腰脊節腠理之間為深痺

風痺

毒天剛柔篇病在陽者命曰風病在陰者命曰痺陰陽俱病者命曰風痺

二病之殊
兩言而定

寒痺

毒天剛柔篇寒痺之為病也留而不去時痛而皮不仁

素問痺論帝問痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為痺也其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛

痺濕氣勝者為著痺也凡痺之客五臟者

客五臟者內而生內症矣

肺痺者煩滿喘而嘔心痺者脉不通煩則心下

鼓暴上氣而喘噎乾噎厥氣上則恐肝痺者夜臥則驚多飲數小便上為引如懷腎痺者喜痿尻以代

踵脊以代頭脾痺者四肢解墜發咳唾汁上為大塞腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄胞痺者

少腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便上為清涕陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷淫

氣喘息痺聚在肺淫氣憂思痺聚在心淫氣遺溺痺聚在腎淫氣乏竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾諸

痺不已亦益內也其風氣勝者其人易已也帝曰痺其時有死者有痼疾者有易已者其故何也岐伯曰

其入臟者死其留連筋骨間者痼久其留皮膚間者易已帝曰其客於六腑者何也岐伯曰此亦其食飲

居處為其病本也帝曰榮衛之氣亦令人痺乎岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五臟麗陳於六腑乃

能入於脉也故循脉上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入於脉也故循皮

能入於脉也故循脉上下貫五臟絡六腑也衛者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入於脉也故循皮

膚之中分肉之間。重於骨髓。其氣則病。從其氣則愈。不與風寒濕氣合。故不為痺。帝曰。善。痺或痛或不痛。或不仁。或寒或熱。或燥或濕。其故何也。岐伯曰。痛者。寒氣多也。有寒故痛也。其不痛不仁者。病久入深。榮衛之行。滯經絡。時疎。故不通。皮膚不榮。故為不仁。其寒者。陽氣少。陰氣多。與病相益。故寒其熱者。陽氣多。陰氣少。病氣勝。陽遭陰。故為痺。熱其多汗而濡者。此其逢濕甚也。陽氣少。陰氣盛。兩氣相感。故汗出而濡也。帝曰。夫痺之為病。不痛何也。岐伯曰。痺在於骨。則重。在於脉。則血凝而不流。在於筋。則屈不伸。在於肉。則不仁。在於皮。則寒。故具此五者。則不痛也。凡痺之類。逢寒則凝。逢熱則縱。陰痺。至真要大論。陰痺者。按之不得。腰脊頭頂痛。時眩。大便難。陰氣不用。饑不欲食。咳唾則有血。心如懸。病本於腎。

筋肌骨痺。長刺節論。病在筋。筋急節痛。不可以行。名曰筋痺。病在肌膚。肌膚盡痛。名曰肌痺。病在骨。骨重不可舉。骨髓酸痛。寒氣至。名曰骨痺。

肉苛。逆調論。帝曰。人之肉苛者。雖近於衣絮。猶尚苛也。是為何疾。岐伯曰。榮氣虛。衛氣實也。榮氣虛。則不仁。衛氣虛。則不用。榮衛俱虛。則不仁。且不用。肉如故也。人身與志不相有曰死。

金匱

問曰。血痺病從何得之。師曰。夫尊榮人。骨弱肌膚盛。重因疲勞汗出。臥不時動搖。加被微風。遂得之。但以脉自微。潘在寸口關上小緊。宜鍼引陽氣。令脉和緊去。則愈。寸口脉沉而弱。沉即主骨弱。即主筋沉。即為腎弱。即為肝汗出入水中。如水傷心。歷節痛黃汗出。故曰歷節。少陰脉浮而弱。弱則血不足。浮則為風。風血相搏。即疼痛如掣。盛人脉濇小短氣。自汗出。歷節痠。不可屈伸。此皆飲酒汗出。當風所致。味酸則傷肝。肝傷則緩。名曰泄。鹹則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。枯泄相搏。名曰斷泄。榮氣不通。衛不獨行。榮衛

俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便為歷節也

痺歷節方

痺症方

治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鈎鈎之即以生桑炭置之坎中高下

以坐等以膏熨急燭且飲美酒噉美炙肉不飲酒者自強也為之三拊而已馬膏馬脂也其性味甘平

諸痛故以桑鈎鈎之者鈎正其口也復以生桑炭置之坎中其緩者桑之性平能利關節除風寒濕痺

於生而得其暖也然後以前膏熨其急燭且飲之美酒噉之其肉者皆助血舒筋法也雖不善飲亦自

寒痺熨法

用醇酒二十升蜀椒一升乾薑一斤桂心一斤凡四種皆咬咀漬酒中用綿絮一升細白

布四丈并納酒中置酒馬矢煖中馬矢煖中者煖馬屎而煖之也蓋封塗勿使泄五日五夜出布綿絮曝乾之乾後復

漬以盡其汁每漬必晡日也其日乃出乾并用淳綿絮複布為複巾重布為中如今之夾絮長六七

尺為六七巾則用生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所後發之若不刺則知先已刺遇然

不易入則刺寒復炙巾以熨之三十遍而止汗出以巾拭身亦三十遍而止

黃耆桂枝五物湯

治血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀

黃耆

桂枝各三兩生薑六兩大棗十二枚右五味以水六升煮取二升溫服七合日三

服一方有人參

此即桂枝湯以黃耆易甘草乃

桂枝芍藥知母湯

治肢節疼痛身體羸弱脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐

桂枝四兩芍藥三兩甘草

麻黃附子二兩生薑血朮各五知母四兩右九味以水

七升煮取二升溫服七合日三服

此為陽虛之症

烏頭湯

治歷節皮痛不可屈伸

麻黃 芍藥 黃耆 甘草各三兩烏頭三枚咀以蜜二升煮取一升即出烏頭右五味咀咀四味水三升煮

取一升去滓納蜜煎中更煎之服七合不知更服之其煎法精妙可師風寒入肺非此不能通達陽氣

獨活寄生湯針 治風寒濕痺傷枯脚氣

獨活三兩桑寄生 秦艽 細辛 歸身 生地 白芍 川芎 桂心

茯苓 杜仲 牛膝 人參 甘草各等一方有防風 右十四味為粗末每服四錢煎

服此驅風通

舒筋飲 治臂痛不能舉由氣血凝滯經絡不能行所致非風非濕腰以下食前服腰以上食後服

片薑黃二錢如黑以赤芍 當歸 海桐皮去粗 白朮各一錢 羌活 炙甘草各一錢 右七

味加薑三片煎服磨沖沉香汁少許

拔毒膏 用生半夏為末同麝香等分先用薑汁將膏煎烊調入半夏塗

史國公酒方聖 治中風語言謇澀手足拘攣半身不遂痿痺不仁

當歸 虎脛骨酒洗 薏苡仁 羌活 龜甲炙 萆薢 防風 秦艽 牛膝 松節

晚蠶沙二兩 枸杞子五兩 延胡根八兩 右為粗末絹袋盛浸無灰酒一斗十日取飲

半身不遂外治方 大活絡丹 指迷茯苓丸俱見

痿

素問

素問痿論黃帝問曰五臟使人痿何也岐伯對曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋脾主身之肌肉腎主身之骨髓故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄者則生痿痺也心氣熱而下脉厥而上上則下脉

虛虛則生脉痿。樞折。挈腰。綴而不任地也。肝氣熱則膽泄口苦。筋膜乾。筋膜乾則腰急而攣。發為筋痿。脾氣熱則胃乾而渴。肌肉不仁。發為肉痿。腎氣熱則腰脊不舉。骨枯而髓減。發為骨痿。帝曰。何以得之。岐伯曰。肺者。臟之長也。為心之蓋也。有所失亡。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱葉焦。故曰五臟因肺熱。葉焦。發為痿。此之謂也。痿症總論。與而皆關於肺。後治痿而用燥熱之藥。誤。悲。哀。太甚。則胞絡絕。胞絡絕。則陽氣內動。發則心下崩。數瘦血也。故本病曰大經空虛。發為肌痺。傳為脉痿。思無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。故下經曰。筋痿者。生於肝。使內也。有漸於濕。以水為事。若有所留。居處相濕。肌肉濡漬。痺而不仁。發為肉痿。故下經曰。肉痿者。得之濕地也。有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍於腎。腎者。水臟也。今水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發為骨痿。故下經曰。骨痿者。生於大熱也。黃帝曰。何以別之。岐伯曰。肺熱者。色白而毛散。心熱者。色赤而絡溢。肝熱者。色蒼而爪枯。脾熱者。色黃而肉瞤。動腎熱者。色黑而齒槁。帝曰。如夫子言。可矣。論言治痿者。獨取陽明何也。岐伯曰。陽明者。五臟六腑之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。衝脈者。經脈之海也。主滲灌谿谷。與陽明合於宗筋。陰陽總宗筋之會。會於氣街。氣街一名氣衝。足陽明經穴。在毛際中。旁開上一寸。動脈處。而陽明為之長。皆屬於帶脉。而絡於督脉。故陽明虛則宗筋縱。帶脉不引。故足痿不用也。帝曰。治之奈何。岐伯曰。各補其榮。諸經所注為榮。謂所和其順逆。筋脉骨節。各以其時受月。則病已矣。時受月。王冰注。謂病所生。氣通天論。濕熱不攘。大筋緩。小筋弛。弛長。緩短。為拘。弛長為痿。

難經

五損損於此。骨痿不能起於牀。

痿方

金剛丸命保 治腎損骨痿不能起於牀

萆薢杜仲炒去絲 從蓉酒浸等分 右為末酒煮腰子搗丸如桐子大每服五七十九溫酒下

虎骨四助丸治脚痿

宣木瓜 天麻 從蓉 牛膝各焙乾 附子 虎骨各一兩 右以上各如法修製先將

前四味用無灰酒浸春秋各五日夏三冬十日取出焙乾入附子虎骨共研為末用浸藥酒打麵糊丸

梧子大每服五十九食前鹽湯下

加減四助丸治腎肝虛熱淫於內致筋骨痿弱足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力

肉從蓉酒浸 牛膝酒浸 木瓜乾 鹿茸酥炙熟地 五味子酒浸 兔絲子酒浸各等分 右為末煉蜜

丸桐子大每服五十九溫酒米飲下一方不用五味有杜仲

煨腎丸治腎肝虛及脾損穀不化

牛膝 萆薢 杜仲炒去絲 白蒺藜 防風 兔絲子酒浸 從蓉酒浸 葫蘆巴

破故紙等分 桂枝減半 右為末將猪腰子製如食法搗爛蜜丸如桐子大每服五七十九溫酒送

下又治腰痛不起亦治腎痿

續骨丹治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行

天麻酒浸 白附子 牛膝 木鼈子各半 羌活半兩 烏頭一錢 地龍去土 乳香 沒藥各二

硃砂一錢 右以生南星末一兩無灰酒炙糊丸雞頭大硃砂為衣此加味活絡丹也舒筋最宜

思仙續斷圓治肝腎風虛氣弱脚不可踐地腰脊痠痛風毒流注下經行止艱難小便餘瀝此補五

臟內傷調中益精涼血堅強筋骨益智輕身耐老

思仙朮

生地

各五兩

五加皮

防風

米仁

羌活

川斷

牛膝

各三兩

草薢

右為細末好酒三升化青鹽三兩用大木瓜半斤去皮子以鹽酒煮木瓜成膏杵丸如桐子大每服三

四十丸空心食前溫酒鹽湯下膏少和酒可也此方治下焦風濕脚氣亦效內經針灸之法獨取陽

筋骨之總司也養其精血而逐其風痰則大略無誤矣

虎潛丸

大活絡丹以上二方俱見通治

厥

靈素

靈顛狂篇厥逆為病也足暴清胸若將裂腸若將以刀切之煩而不能食脉大小皆濇厥逆之候如此甚矣

素厥論黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥帝曰熱厥

之為熱也必起於足下者何也岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脉者集於足下而聚於足心故陽氣勝

則足下熱也帝曰寒厥之為寒也必從五指而上於膝者何也岐伯曰陰氣起於五指之裏集於膝下而

聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從內也解精微論厥則目無所見夫人厥

則陽氣并於上陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也厥則無不因陽氣在

而用辛熱滋膩之藥貽害無窮調經論血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死陽明脉解

論厥逆連藏則死連經則生瘡能煎厥素脉解篇內奪而厥則為瘡能此腎虛也少陰不至者厥也肝氣當治而未得故善怒善怒

者名曰煎厥劉河間地黃引生氣通天論陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥此當治肝

薄厥素生氣通天論陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥此當治

陽明厥 素陽明脉解論陽明厥則喘而惋惋則惡人

少陰厥 素脉要精微論脉復沉細數者少陰厥也

風厥 素評熱論汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥此當

尸厥 素繆刺論五絡俱竭令人身脉皆動而形無知也其狀若尸名曰尸厥

難經

督之為病脊強而厥

金匱

問曰寸脉沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟即死入腑即愈此為卒厥何謂也師曰唇口青身冷為入臟即死如身和汗自出為入腑即愈

卒厥之症頗似中風或誤治死不旋踵

傷寒論

寸口諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊為寒諸乘寒者則為厥醫言不仁以胃無穀氣脾瀦不通口急不能言戰而慄也少陰脉不至腎氣微少精血奪氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥少陽厥陰俱病耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死

厥寒

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

以下所論諸得皆指傷寒症手足逆冷而言非氣逆不知人之厥也傷寒始發熱六日厥反九日而利凡

厥利者當不能食今反能食者恐為除中食以素餅不發熱者知胃氣尚勝必愈傷寒一二日至四五

日而厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤此

凡厥者陰陽氣不相順接便為厥此致厥厥者手足逆冷是也此傷寒脉微而厥至七八日膚冷其

人躁無暫安時者此為臟厥。傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數小便利。色白者此熱除也欲得食其病為愈。若厥而嘔胸膈煩滿其後必便血。裏熱入病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也。傷寒發熱下利厥逆躁不臥者死。傷寒發熱下利至其厥不止者死。傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此為亡血下之死。傷寒脈促手足厥逆者可灸之。下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死。虛寒下利後脈絕手足厥冷時時脈還手足溫者生脈不還者死。病人手足厥冷脈乍結以客氣在胸中。心中滿而煩欲食不能食者病在胸中當吐之。傷寒論諸條有寒有熱有虛有實有寒熱互乘其變不一隨病異形非厥之正病也尤不可不滑心體察凡一病其變態不同如此何可執一說以人命為兒戲耶

厥方

尸厥方素問以竹管吹其兩耳鬚同其左角之鬚方一寸燭治飲以美酒燭治厥末也

赤圓金匱寒氣厥逆主之

茯苓半夏各四兩洗烏頭二兩細辛一作人參

先食酒飲下三九日再夜一服不知稍增之以知為度。真朱即右六味末之內真朱為色煨蜜丸如麻子大

茯苓甘草湯傷寒傷寒厥而心下悸者宜先治水當服此湯却治其厥不厥水瀆入胃必作利也

茯苓二兩桂枝二兩生草一兩生薑二兩右四味水四升煮取二升分溫三服

尸厥方金匱治尸厥脈動而無氣氣閉不通故靜而死也草蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑著舌下

白薇湯林事人平居無苦疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口瘡不能言或微知人或惡聞人聲但如眩冒移時方寤此由出汗過多血少氣併於陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死

氣過血還陰陽復通移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜服

白薇

當歸各一人參

甘草各一錢

右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服此病最

而婦科皆不知無不誤治

四逆湯

論傷寒

下利厥逆而惡寒者主之大汗若大下利而冷厥者亦主之方見傷寒

通脈四逆湯

論傷寒

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者主之方見通治 附加減法如面色赤者加葱九莖

腹中痛者去葱加芍藥二兩 嘔者加生薑二兩 咽痛者去芍藥加桔梗一兩 利止脈不出者去

桔梗加人參一兩

當歸四逆湯

論傷寒

手足厥冷脈細欲絕者主之方見傷寒 以上三方皆治寒極之厥與熱厥正相反須辨之

瓜蒂散

白虎湯

此治熱厥方俱見傷寒

烏梅丸

此治蟲厥見蟲門

蘇合香丸

此治氣厥

四磨飲

至寶丹

以上三方俱見通治

虛勞

金匱

夫男子平人脈大為勞極虛亦為勞 男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脈浮者裏虛也 男子脈虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面赤白時目暝兼血少腹滿此為勞使之然 勞之為病其脈浮大手足煩春夏夏秋冬瘕陰寒精自出酸削不能行 男子脈浮弱而澀為無子精氣清冷 男子平人脈虛弱細微者喜盜汗也 人年五六十其病脈大者痺使背行若腸鳴馬刀使瘦者皆為勞得之 脈沉小遲名脫氣其人疾行則喘渴手足逆寒腹滿甚則澀泄食不消化也 脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛虛寒相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精古人所謂虛勞皆是純虛無嘔之病乃是血症有似虛勞其實非虛勞也

病源

夫虛勞者五勞六極七傷是也五勞者一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰瘦勞六極者一曰氣極二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰肌極六曰精極七傷者一曰陰寒二曰陰萎三曰陰急四曰精連連五曰精少陰下濕六曰精清七曰小便苦數臨事不卒

五蒸一骨蒸根在腎二脉蒸根在心三皮蒸根在肺四肉蒸根在脾五內蒸亦名血蒸必外寒而內熱把手附骨而內熱甚根在五臟六腑又有二十三蒸各有證名

肺勞者短氣面腫鼻不聞香臭肝勞者面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨臥目視不明心勞者忽忽喜忘大便苦難或時鴨渡口內生瘡脾勞者舌苦直不能咽唾腎勞者背難以俛仰小便不利色赤黃而有餘滯莖內痛陰濕囊生瘡小腹滿急此乃五臟之勞

虛勞方

桂枝加龍骨牡蠣湯金匱失精家少腹弦急陰頭寒目眩一作頭暈髮落脉極虛孔淫為清穀亡血失精脉

得諸孔動微緊男子失精女子夢交此湯主之

桂枝二兩芍藥生薑各三甘草二兩大棗十二龍骨牡蠣各三右七味以水七升煮取

三升分溫三服脉極虛孔淫乃為虛寒之症故用桂枝及建中等湯若數血而脉數者乃陰虛之症與此相反誤用必龍

薯蕷丸金匱虛勞諸不足風氣百疾主之

薯蕷分三十當歸桂枝麴乾地黄豆黃卷各十分甘草八分人參十分芩藟

芍藥白朮麥門冬各六分柴胡桔梗茯苓各五分阿膠七分杏仁六分乾薑三分

白斂二分防風六分大棗百枚右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一九一百丸為劑

大黃蟄蟲丸金匱五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾

血肌膚甲錯兩目暗黑此丸主之

大黃^{十分} 黃芩^{二兩} 甘草^{三兩} 桃仁^{一升} 杏仁^{一升} 芍藥^{四兩} 乾地黄^{十兩} 蟬蛸^{一升} 乾漆^{一兩}

蝨蟲^{一升} 水蛭^{百枚} 蠱蟲^{半升} 右十二味為末煉蜜為丸小豆大酒飲服五九日三服血朝則病

草木之品所能下必用食血之蟲以化之此方專治瘀血成勞之症或不能下則正氣永無復理故去病即所以補虛也

治夢洩精方金

韭子^{一升} 右為末酒服方寸匕日三服立效

羌活補髓九針 療髓虛腰痛不安膽腑中寒

羌活 川芎 當歸^{各三} 桂心^{二兩} 人參^{四兩} 酥^{一升} 大麻仁^{二升} 熬 棗肉^{一斤} 研 牛髓

羊髓^{各一} 右十味先節前五味為散後用棗肉麻仁打勻再下二髓及酥重湯煮之為丸桐子大

酒服三十丸日再服

肘後癩肝散^{金匱方} 治冷勞又主鬼疰一門相染

癩肝^{一具炙乾末之} 右水服方寸匕日三服

骨蒸方針 療虛熱骨蒸羸瘦煩悶短氣喘息兩鼻孔張日西即發

龍膽 黃連 括萎^{各一} 梔子^{二枚} 芒硝^{半兩} 青柏子 苦參 大黃 黃芩

芍藥^{各半} 右十一味搗篩為末煉蜜和丸如梧子大飲服十九日二服以知為度此為純寒之劑

救急療瘦疾方^{金匱方}

炙甘草^{三兩} 右一味小便煮服^{用小便便奇此方亦治咽痛}

口乾方^{金匱方} 療脾熱脇痛熱滿不歇目赤不止口唇乾裂

石膏煅煉

生地汁

赤蜜各一升 淡竹葉五升

右四味水一斗五升先煮竹葉取七升去滓煮石

膏取一升五合去滓納地黃汁煮二三沸下蜜煎三升細服

傳屍勞方外臺

獾肝一具 乾炙

驚甲一枚 炙

野狸頭一枚 炙

紫苑四分

漢防己一兩

蜀漆洗

麥冬

甘草一兩 炙

右藥

搗篩已成煉烱羊腎脂二分合蜜一分烱令和丸桐子大每服十丸加至十五丸日再其藥合和分一

分懸門額上一分著頭邊一分擊臂上先服頭邊次服臂上次服門上大驗

秦艽龜甲散寶鑑

治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤氣粗困倦盜汗

驚甲

柴胡

地骨皮各一兩

秦艽

知母

當歸各五錢

右為末每半兩入烏梅一枚青

蒿五葉同煎臨臥空心溫服

秦艽扶羸湯頤和

治肺痿骨蒸勞嗽聲啞自汗體倦

驚甲

秦艽

當歸

人參各一兩

柴胡二錢

地骨皮

紫苑

半夏

甘草各一錢

右九味加薑棗煎服

十味煎外臺

治凡病在胸膈上者宜飽服而在夜肺既居上則病在上晝宜服九夜宜合桑白皮汁等服

桑白皮

一升地骨皮

三升

二味以水七升煮取三升去渣澄清

生地汁五升麥冬汁二升

生薑汁一升竹瀝

生葛根汁各三升

白蜜一升

牛酥三合

大棗一升

右十味先煮生地以下葛

根以上和煎減半則內桑皮等和煎之三分減一則內酥蜜棗等藥攪之勿停手如稠飴狀每服胡桃

大一枚哈之一滋潤肺經此為第一薑汁宜用少許

百花煎類方

奇要

治吐血咳嗽補肺

生地汁

藕汁

黃牛乳各一

胡桃研十枚

黃明膠炙燥末半兩

生薑汁半斤

乾柿五枚

右藥煎減半入好蜜四兩漫火

大棗二十一枚

清酒一升

秦芫半兩末

杏仁三兩

右藥煎減半入好蜜四兩漫火

養成入磁器服一匙

米飲調下

方內薑汁太多

人參蛤蚧散

治二三年間肺逆喘嗽咯吐膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對

杏仁五兩

甘草炙三兩

人參

茯苓

貝母

知母

桑白皮各二

右為細末磁器內盛每日如茶點服神效

金鎖固精丸

治夢遺滑精

芡實

蓮鬚

茯苓各二

龍骨炙兩

牡蠣煅四兩

右以蓮子粉糊丸服鹽湯送下

金鎖丹秘事

治夢泄遺精關鎖不固

茴香

葫蘆巴

破故紙炒

白龍骨各一

木香一兩

胡桃三十個

羊腎三對切開用鹽

右

為末和二膏研勻酒浸煮熟丸桐子大每服三五丸鹽湯下

金鎖正元丹

治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節酸疼精神昏困手足多冷心忪盜汗飲食減少

小便滑數遺精白濁

五倍子

茯苓各八

補骨脂十兩

紫巴戟去心

葫蘆巴炒

茯苓洗淨各

硃砂別研

龍骨各三

右為細末入研令勻酒糊為丸如桐子大每服十五丸至二十丸空心食前溫酒或鹽湯下

犀角紫河車丸

治傳尸勞三月必平復其餘勞症即消數服神效

紫河車一具米泔浸

一釐甲酥炙

桔梗

胡黃連

白芍

敗鼓皮心

醋炙

大黃

龍膽草

黃藥子

知母各二

芒硝

犀角鎔

硃砂各二

右為末

蜜丸桐子大硃砂為

衣空心溫酒服二十九如膈熱食後服重病不過一料

小建中湯

金匱黃耆建中湯

炙甘草湯

附方 大建中湯

八味地黃丸

金匱人參養榮湯

瓊玉膏

生地黃煎

外臺四物二連湯

元戎以上九方俱見通治

消證

附原

靈師傳為胃中熱則消穀令人懸心善饑 素氣厥論心移寒於肺肺消肺消者飲一溲二死不治 陽

陰別論二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息責死不治 氣厥論心移熱于

肺傳為膈消

金匱

厥陰之為病消渴氣上衝心心中疼熱飢而不欲食食即吐蛇下之不肯止

此症不可

病源

夫消渴者渴不止少便是也其病變多發癰疽此坐熱氣留於經絡血氣壅滯故成癰膿 內消病者

不渴而小便多是也利多不得潤養五臟臟衰則生諸病由腎盛之時恣意快情致使虛耗故不渴而小

便多也 強中病者莖長興盛不痿精液自出由少服五石熱住於腎中下焦虛少壯之時血氣尚豐能

制於五石及至年衰血氣減少腎虛不復能制津液若精液竭則諸病生矣

消證方

文蛤散 金匱 渴欲飲水不止者主之 傷寒論治心煩內上粟起意欲飲水反不渴者

文蛤五兩

上一味杵為散以沸湯五合和服方寸匕

欲飲而不渴乃胸中有水而口燥也

消渴方金

括蔞根

生薑

麥冬

蘆根

切各二升茅根切三升

右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服

此清胃之方

茯神湯金

洩熱止渴治胃腑實熱引飲常渴者

茯神二兩

括蔞根五兩

生麥冬五兩

薑糖四兩

知母四兩

生地黃六兩

小麥二升

大棗二十枚

淡竹葉切三

右九味以水三斗煮小麥竹葉取九升去渣下藥煮取四升分四服不問早晚但渴即進通治渴患熱者

黃連圓治渴方金

黃連一斤

生地黃一斤

右二味絞地黃汁浸黃連出曝燥復內汁中令汁盡乾搗末蜜丸桐子大服二十九日三食前後無拘亦可為散酒服方寸匕

此治胃中有伏火之方製法神妙本方用冬水汁收入黃連內為丸即以冬水汁煎大麥仁湯

下亦仿此義則知多此冬水亦妙也

桑根湯金

主日飲一石水方

桑根白皮切五升入地三尺

右一味水煮以味濃為度適寒溫任性飲戒食鹽

神效散本方

治渴疾飲水不止

白浮石

蛤粉

蟬蛻各等

右細末用鯽魚膽七個調三錢服不拘時候神效

諸腎齊尼湯金

強中之病莖長興感不交精液自出消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服

諸腎一具

大豆一升

薺尼三兩

人參

石膏各三

茯神

磁石

知母

葛根

黃芩

甘草

括蔞根各二

以水三升

此原

合一劑病勢漸歇即止

腎氣丸見通治

白虎人參湯乾裂方見虛勞

蘭臺軌範卷三

吳江徐靈胎洞溪著

傷寒

素問

素熱論篇帝曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也。或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者，何也？岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也。其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱。熱雖盛，不死，其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其故。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛，腰脊強。二日，陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻絡於目，故身熱目疼而鼻乾，不得卧也。三日，少陽受之，少陽主膽，其脈循脇絡於耳，故胸脇痛而耳聾。三陽經皆受其病，而未入於臟者，故可汗而已。四日，太陰受之，太陰脈布胃中，絡於嗌，故腹滿而嗌乾。五日，少陰受之，少陰脈貫腎絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日，厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽五臟六腑皆受病，榮衛不行，五臟不通，則死矣。皆連五臟故曰入臟非風寒直入臟中也其不兩感於寒者，七日，巨陽病衰，頭痛少愈。八日，陽明病衰，身熱少愈。九日，少陽病衰，耳聾微聞。十日，太陰病衰，腹減如故，則思飲食。十一日，少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏。十二日，厥陰病衰，囊縱少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其臟脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已；其滿三日者，可泄而已。水熱穴論帝曰：人傷於寒而傳為熱，何也？岐伯曰：夫寒甚則生熱也。

兩感 素熱論帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日，則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿。二日，則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食，譫言。三日，則少陽與厥陰俱

病則耳聾囊縮而厥陰水漿不入不知人六日死帝曰五臟已傷六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故不知人三日其氣盡故死

兩感則表裏同病

溫病暑病

素熱論凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗皆出勿止

陰陽交

素評熱病論帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病為何岐伯曰

病名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉

而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗出者精氣也今汗出而輒復熱

者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死今脈

不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也

遺證 素熱論帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱盛而強食之故有所遺也若此者皆

病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆

從可使必已矣帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

難經

傷寒有幾其脈有變不然傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同中風之脈陽

浮而滑陰濡而弱濕溫之脈陽濡而弱陰小而急傷寒之脈陰陽俱盛而緊濇熱病之脈陰陽俱浮浮之

而滑沉之散濇溫病之脈行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之傷寒有汗出而愈下之而

死者有汗出而死下之而愈者何也然陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虛汗出而死下之而愈

陰盛者風傷衛而汗自出也寒氣在內而未出也陽盛陰虛者身熱汗開燥火內結津液乾枯陰氣欲竭也此以有邪處為虛無邪處為盛

傷寒論六經脈證

太陽病脈浮而項強痛而惡寒 尺寸俱浮者太陽受病也其脈上連風府故頭項痛腰脊強 發熱汗出惡風脈緩者名曰中風 惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒 發熱惡寒者發於陽也無熱惡

寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊惡寒未解陽明病若能食名中風不能食名中寒 尺寸俱長者陽明受病也其脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不能卧 陽明外證身熱汗自出不惡寒反

惡熱也邪氣已離太陽陽明脈大以上皆陽明之經病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明此三條皆傳病之證太陽陽明者

脾約是也 少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也 陽明之為病胃家實也此正陽陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

少陽之為病口苦舌乾目眩也 尺寸俱弦者少陽受病也其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾 少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚 傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽

發熱與太陽同而脈之弦細獨異三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗出內熱傷寒六七日無大熱內熱輕則其人躁煩者此為陽去入陰也若熱輕而不煩傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為

三陰不受邪也 太陰之為病腹滿而嘔食不下自利益甚時腹自痛 尺寸俱沉細者太陰受病也其脈布胃中絡於噦故腹滿而噦乾 傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰同一太陰病而有沉細浮緩之殊蓋沉自利不

渴者屬太陰以臟有寒故也當溫之宜服四逆輩此少陰自利而渴熱入下焦也少陰之為病脈浮細但欲寐也衛氣行於陽則寐行於陰則寐少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少

陰也 尺寸俱沉者少陰受病也以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食食則吐蛇下之利不止 尺寸俱微緩者厥陰受病也以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮 厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈

傷寒傳足不傳手經脈

此本太陽經脈最為明驗

足太陽脈起於目內眦從頸下後項連風府行身之後終於足其外證頭疼項強腰脊痛骨節痛惡心發熱惡寒標病宜發汗但太多則亡陽筋惕肉瞤 小便不利者當利自利者不可利利之引熱入膀胱其人如狂 不可下下之為結胸

足陽明脈起於鼻頰絡於目循面下人迎入缺盆下膈屬胃行身之前終於足之厲兌故其證目痛鼻乾不得眠頭頰痛身熱微惡寒無汗者屬標病宜解肌身熱發渴汗出屬本病宜清熱解肌 若惡熱自汗發渴去衣被發斑發黃發狂大便秘腹滿此正陽明胃腑病也宜下之

足少陽脈起於目銳眥上抵頭循角絡耳中循胸脇行身之側終於足故頭角痛目眩耳聾脇疼心下痞寒熱往來嘔而口苦膽熱也此經無標本只有小柴胡一湯和解隨證加減有三禁汗之犯太陽下之犯陽明利之犯少陰 脈弦數者是本經證

足太陰為三陰經首其脈始於足大指上行至臍絡於喉連舌本行身之前也故腹滿自利咽乾嘔吐腹滿邪入脾也嘔吐脾氣不和也自利挾熱下利也咽乾脾脈連喉也頭不疼陰脈至頸而還也身微熱手足溫表邪解而傳入裏也身目俱黃標病宜平熱腹滿硬痛渴而喉乾小便赤大便難本病雖宜下然當分寒熱施治足少陰脈始於足心上行貫脊循喉絡舌本下注心胸行身之後也其病手足乍冷乍溫身不熱者標病二便不通舌乾口燥者本病此經本熱而標寒也宜急下以存腎水雖自利此是飲湯水所致不可疑為寒也初病大熱至此變為厥冷者是熱深厥亦深也急下之至陰又難拘定法因分直中者

寒證傳經者熱證大抵六經中惟此難辨有直中真陰者有夾陰中寒者有夾陰傷寒者有虛陽伏陰者有陰極發躁者有漏底傷寒者前二證身不熱厥冷全似少陰傳經而冷者後四證身熱面赤又全似陽大要口燥舌乾渴而謔語大便實者傳經熱證也足冷嘔吐瀉利不渴或惡寒腹痛者直中真寒證也足厥陰脈始於足大指上循陰器抵小腹循脇上口唇與督脈會於顛頂行身之側也其證煩渴囊拳消渴舌捲謔語大便不通而頭疼手足乍冷乍溫者此是陽經傳來熱邪本病宜急下若發熱惡寒狀如瘧疾此是熱邪在經標病宜和解若不嘔便清當有大汗至而自愈頭疼者以督脈會於顛頂故也大抵熱深厥亦深則舌捲囊縮肝主陰陰寒冷極亦捲縮須以口渴不渴足冷不冷脈沉實沉細別之後人皆指為極寒概用溫熱誤人無算數請傷寒論自知

傷寒六經治法方

諸方精義俱詳余所著傷寒類方中不更贅

桂枝湯

與本傷寒論

治太陽中風頭皮發熱汗出惡風

桂枝

三兩

芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大枣

十二枚

右五味

咬咀

以水七升

微火煮取三升

去滓

適寒溫服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許通身熱微似有汗者最佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服當小

促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物此服外感風寒之藥服法俱當如此

麻黃湯 治太陽中寒頭身俱痛發熱無汗惡風而喘

麻黃 治太陽中寒頭身俱痛發熱無汗惡風而喘

麻黃 治太陽中寒頭身俱痛發熱無汗惡風而喘

麻黃 治太陽中寒頭身俱痛發熱無汗惡風而喘

藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

桂枝麻黃各半湯 治傷寒向愈脈微緩惡寒身癢

桂枝一兩十六分藥酒洗生薑切甘草炙麻黃各一兩大棗四枚杏仁二十四個湯浸去皮右

七味以水五升。先煮麻黃一二沸。去上沫。納諸藥。煮取一升八合。去滓溫服六合。令微汗則愈。

桂枝加葛根湯 治太陽病項背強八九反汗出惡風

葛根四兩芍藥二兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚桂枝三兩右六味以水一斗。先煮葛根減二

升。去上沫。納諸藥。煮取三升。去滓溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法。本方無麻黃。若加麻黃。則為葛根湯矣。陳

無己本誤加

葛根湯 治太陽病項背強無汗惡風者。又治太陽陽明合病自下利者。

葛根四兩麻黃三兩桂枝二兩芍藥二兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚右七味。以水一斗。先煮葛根減二升。去上沫。納諸藥。煮取三升。去滓溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法。將

息及禁忌。

葛根黃芩連湯 治太陽證誤下利遂不止。喘而汗出者。此主之。

葛根半斤甘草炙黃芩二兩黃連三兩右四味以水八升。先煮葛根減二升。入諸藥。煮取二升。去滓分溫再服。

桂枝加芍藥湯 治太陽誤下。腹滿時痛。屬太陰也。此主之。太實痛者。加大黃一兩。即桂枝加大黃湯。

桂枝三兩芍藥六兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚右五味。以水一斗。先煮桂枝減二升。去滓。分溫再服。

適寒溫服一升。此即桂枝湯加芍藥一兩。即另成一方。而以之治太陰病。必腹滿。

大青龍湯 治太陽中風。脈浮緊。惡寒發熱。身不汗出而煩躁者。

大青龍湯 治太陽中風。脈浮緊。惡寒發熱。身不汗出而煩躁者。

大青龍湯 治太陽中風。脈浮緊。惡寒發熱。身不汗出而煩躁者。

麻黃二兩桂枝二兩甘草二兩杏仁四十粒生薑三兩大棗十二枚石膏如雞子右七味以水九升

先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之一服汗者

停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也此風寒兩傷之方按載大青龍可以不解小青龍蓋

桂枝加桂湯治燒針令其汗針處被寒核起微赤必發奔豚灸其核上各一壯與此湯即桂枝湯加

桂二兩

小柴胡湯治少陽中風往來寒熱胸脇苦滿心煩喜嘔腹痛心悸頭汗出舌上胎白及婦人熱入血室

等證

柴胡半斤黃芩二兩人參二兩甘草二兩半夏半升生薑三兩大棗十二枚右七味水一斗二升煮

取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服若胸中煩而不嘔去半夏人參加枳實一枚若渴

者去半夏加人參合煎成四兩半括薑根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脇下痞鞭去

大棗加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂

三兩溫覆取微汗愈若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩此方加減

大柴胡湯治傷寒十餘日柴胡證仍在嘔而心下急心中痞鞭而痞熱結在裏往來寒熱等證

柴胡半斤黃芩三兩芍藥三兩半夏半升生薑五兩枳實四枚大棗十二枚右八味以水

一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

大承氣湯治傷寒十餘日吐下後不解晡時發潮熱獨語如見鬼狀尋衣摸牀胃中有燥屎也此下之

大黃四兩厚朴半斤枳實五枚芒硝三合右四味以水一斗先煮二物取五升去滓納大黃煮取

二升去滓納芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服胃中非存燥屎之所此言胃中者指足陽

小承氣湯 治汗多微發熱不惡寒或小便數而大便鞭譴者與此湯微和胃氣

大黃四兩厚朴二兩枳實三枚

衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之 右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更

調胃承氣湯 治胃氣不和不惡寒但熱腹微滿而煩與此湯

大黃四兩清酒浸甘草二兩芒硝半斤

更上火微煮令沸少少溫服不惡寒乃外邪已盡方可下此仲景之要法 右三味以水三升先煮大黃甘草取一升去滓納芒硝

桃核承氣湯 治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻宜先與桂枝

解外外解已但小腹急結此主之

桃仁五十個去皮尖桂枝二兩去皮大黃四兩芒硝二兩甘草二兩

硝更上火微沸下火先令溫服五合日三服當微利 右五味以水七升煮取二升半去滓納芒

抵當湯 治傷寒六七日少腹鞭小便不利其人如狂喜忘大便黑此有蓄血

水蛭熬蟅蟲各三十個翅足熬桃仁三十個去皮尖大黃三兩酒浸 右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一

升不下再服

抵當丸 治傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥

水蛭二十個蟅蟲二十個桃仁二十個去皮尖大黃三兩 右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之

時時當下血若不下者更服

大陷胸湯 治表未解而醫反下之胃虛而陽氣內陷心下有鞭舌上燥渴小有潮熱心下至少腹痛不

可近

大黃去兩芒硝一升甘遂一錢右三味以水六升先煮大黃取二升去滓納芒硝煮一兩沸納甘

遂末溫服一升得快利止後服

結胸乃水飲為患傷寒論云此為水結故用甘遂

大陷胸丸治病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之

太早故也

大黃半斤葶藶子煮芒硝杏仁去皮尖熬右四味搗篩二味納杏仁芒硝合研如脂和散

取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取

下為效

小陷胸湯治病在心下按之則痛脈浮滑者

黃連一兩半夏半升栝婁實大者右三味以水六升先煮栝婁實取三升去滓納諸藥煮取二升去

滓分溫三服

白虎湯治脈滑而厥裏有熱也又治三陽合病腹滿身重譫語遺尿自汗出者

知母六兩石膏一斤甘草二兩粳米六合右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

陽極於內發散則路遠故從小便去之

麻黃附子細辛湯治少陰始得病反發熱脈沉者

麻黃去節細辛各二兩附子一枚炮去皮破八片右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納藥煮取三升

去滓溫服一升日三服

四逆散治少陰傳經熱邪四逆或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄痢下重者

甘草炙枳實破水漬柴胡各十分芍藥各十分右四味搗篩白飲和服方寸匕日三服效者加五

味子乾薑各五分并主下痢 悸者加桂枝五分 小便不利者加茯苓五分 腹中痛者加附子一

枚炮令拆 泄痢下重者先以五升煮雞白三升煮取三升去滓以散三方寸匕納湯中煮取一升半

分溫再服熱邪入深乃見四逆誤認為寒胎毒雖細能治下重以能洩大腸之氣也

四逆湯 治脈沉體痛溫欲吐下利清穀手足厥冷內寒外熱脈微欲絕等證

甘草二兩 乾薑二兩 附子一枚主用去 右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強

人可大附子一枚乾薑三兩四逆湯不可輕用一症不具即當細審諸症皆全方可決用無疑

四逆加人參湯 治痢後亡血 本方加人參

通脈四逆湯 治下痢清穀脈絕汗出而厥 本方加乾薑一倍

通脈四逆加豬膽汁湯 治汗出而厥脈絕拘急 本方加豬膽汁

當歸四逆湯 治手足厥冷脈細欲絕脈浮革因而腸鳴者

當歸 桂枝 芍藥各三兩 細辛二兩 大棗二十枚 甘草五兩 通草各二兩 右七味以水八升煮取

三升去滓溫服一升日三服此四逆症乃從太陽誤下所致非厥陰少陰之四逆也故仍以桂枝湯為主

理中丸及湯 治霍亂頭痛發熱身皮膚痛寒多不用水者理中湯若大病瘥後喜噦久不了了胃上有寒者用理中丸

人參 甘草炙 白朮 乾薑略三 右四味搗篩為末蜜丸如雞子黃大以沸湯數合和一

丸研碎溫服之日三服夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮

取三升去滓溫服一升日三服四逆乃溫下焦中焦之法理中為溫上焦中焦之法各有部位也

附子瀉心湯 治心下痞而復惡寒汗出

大黃二兩 黃連 黃芩各一兩 附子一枚破別煮取汁 右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去

滓納附子汁分溫再服治上焦用生藥故清而不

梔子豉湯 治汗吐下後虛煩不得眠及大下之後身熱未去心中結痛或微煩者

梔子十四枚 香豉一升右二味以水四升先煮梔子得二升半納豉煮取一升半去滓分為二服溫

進一服得吐者止後服聊在至高之分以此吐之所謂在上者

真武湯 治太陽汗出不解仍發熱心憊頭眩身瞤動振振欲倒地者 又治少陰至四五日小便不利

四肢沉重痠痛自下利此為有水氣

茯苓 芍藥 生薑略切 白朮二兩 附子一枚破八片 右五味以水八升煮取三升去滓溫服

七合日三服此治水逆 若欬者加五味半升細辛乾薑各一兩 若小便利者去茯苓 若下利者

去芍藥加乾薑二兩 若嘔者去附子加生薑足前成半斤

大黃黃連瀉心湯 治傷寒脈浮緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳此主之

大黃二兩 黃連一兩 右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服凡治下焦之補劑當多

瀉劑當不通以生為主此亦治至高之熱和故亦用生藥

白通湯 治少陰下利

蔥白四莖 乾薑一兩 附子一枚生用去 右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服此為

白通加豬膽汁方 治服白通湯利不止汗出而厥逆無脈乾嘔而煩服湯後脈暴出者死微續者生

即白通湯煎成納人尿五合豬膽汁一合分溫再服

豬膚湯 少陰病下利咽痛胸滿心煩者此主之

豬膏一斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得溫分六服

陰之虛火下達

甘草湯桔梗湯 治少陰咽痛先與甘草湯不瘥與桔梗湯

甘草二兩

右一味以水二升煮減半去滓溫服七合日二服 桔梗湯加桔梗一兩煎法同

陰在上之大

瓜蒂散 治太陽病胸中痞鞭氣上冲胸不得息此胸中有寒也又或手足厥冷脈乍緊心中煩滿不能

食病在胸中並當吐之

瓜蒂熬 赤小豆各一

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮

作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

麻黃升麻湯 治傷寒六七日大下後厥逆寸脈沉遲下部脈不至咽喉不利吐膿血泄利為難治主之

麻黃二兩 升麻

當歸各一分 知母

黃芩

姜薤各八銖 石膏

白朮

乾薑

芍藥

天冬去心 桂枝

茯苓

甘草六銖

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上

沫納諸藥煮取三升去滓分溫三服令汗出愈

旋覆代赭湯 治傷寒汗出吐下後心下痞鞭噎氣不除此主之

旋覆花 三兩 人參 二兩

生薑 五兩

半夏 半升

代赭石 一兩

大棗 十二枚 甘草 三兩

右七味以水一斗

煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

苦酒湯 治少陰病咽中生瘡聲不出者

半夏 洗破十枚

雞子 一打去黃納

右二味納半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去

滓少少含嚥之。不差更作三劑服之。製法

枳實梔子豉湯 治大病瘥後勞復

枳實三枚 梔子十四枚 豉一升 右三味以清漿水七升。空煮取四升。納枳實梔子。煮取二升。下豉更

煮五六沸。去滓。溫分再服。覆令微似汗。若有宿食者。加大黃如博碁子大五六枚。大病後勞復。用降氣

清火之品

竹葉石膏湯 治傷寒解後虛羸少氣。氣逆欲吐者。故少氣者多屬大症

燒視散 治陰陽易病。其人身重少氣。少腹裏急。陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不舉。眼中生花。膝脛拘急。

右取婦人中視。近陰處剪燒灰。以水和服方寸匕。日三服。小便即利。陰頭微腫則愈。婦人病。取男子視。

當燒灰

豬膽導法 以豬膽汁加醋納穀道中。

蜜煎導法 以蜜煎老。捏作指大一條。納穀道中。以手按之。

右二方俱治傷寒大發汗。小便利。津液內竭。大便雖鞭不可攻之。用此法。

治男子新病起。房內復者方針 取女人月經赤帛。燒服方寸匕。亦治陰卵腫。縮入腹。絞痛欲死。

治交接勞復。陰卵腫。縮腹中絞痛。便欲死方針 取所交接婦人衣服。以覆男子。立愈。

竹皮湯 治交接勞復。卵腫腹痛。便絕欲死。

青竹皮 一升 右一味水三升。煮五六沸。絞汁頓服。立愈。此方范汪亦治大便後勞復。

療食勞方 杏仁五十枚 右一味以酢二升煎取服之。取汗則差。

治結胸灸法本事

巴豆十四黃連七寸連

右搗細末用津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹中有聲其病去矣不

拘壯數以病退為度便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也此法最穩凡胸中病俱可飲此法外治

鵲石散林事

治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋

黃連

寒水石格等

右為細末每服二錢濃煎甘草汁調服

蠶甲散活人

治傷寒八九日不瘥名曰壞證傷寒不能治者宜此療之

升麻

前胡去蘆烏梅去核枳實炒犀角鎔黃芩略半生地黃切兩甘草一分蠶甲法

黃梓兩

右劉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

升麻黃甲湯

陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治此湯主之

升麻

當歸一兩蜀椒炒去汗甘草二兩蠶甲手指大雄黃兩

右六味以水四升煮取一升

頓服之老小再服取汗

升麻黃甲去雄黃蜀椒方

陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻黃甲

湯去雄黃蜀椒主之

肘後千金方陽毒用升麻湯無蠶甲有桂陰毒用甘草湯即本方無雄黃活人

陽毒升麻湯用犀角射干黃芩人參無當歸蜀椒黃甲雄黃蜀椒辛熱之品陽毒用而陰毒反去之

梔子仁湯活人

治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子仁

柴胡半兩升麻

黃芩略二赤芍一兩大青一兩石膏二兩知母一兩甘草半兩

杏仁二兩湯浸去皮尖及

右件搗為粗末每服抄四錢以水一盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候溫服

還陽湯林事

治陰毒面色青四肢逆冷心燥腹痛用硫黃末新汲水調下良久或寒一起或熱一起

更有緊慢再服一二錢則為汗出差

姜桂湯活人書

治風濕康療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛喉咽乾舌強胸內痰痞滿腰背強

姜桂三分

石膏一斤 白薇

麻黃湯泡焙 川芎

葛根生者可 大羌活去蘆 甘草炙

杏仁去皮尖雙仁

青木香春用半兩炒

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞日三四服

此清熱之劑可治時疫

白虎加蒼木湯本事

治濕溫多汗

知母五兩

甘草二兩

石膏一斤 蒼朮

粳米各三兩

右為末每服四錢水一盞半煎至七分去滓

取汁溫服

黑膏活人書

治溫毒發斑

好鼓一升

生地黃切斤

右二味以豬膏二斤合露之煎令三分減一絞去滓用雄黃麝香如大豆

者內中絞和盡服之毒便從皮中出則愈外感之症治之得宜六七日間無不愈者過期不愈皆治

治法千端聚公不忽故仲景傷寒論合傷寒之正方不過數首錄皆誤治之變症故取治雜病之方隨

症收療也按傷寒為外感之總名傳變出入千頭萬緒仲景傷寒論一字不可遺漏今止舉六經本

症及六經主方數首以存大畧不可以此而廢全書也能將傷寒全書熟讀而

病通之則凡為外感之病游刃有餘矣故此集外感之方選錄甚少意有在也

百合病

金匱

論曰百合病者百脈一宗悉致其病也意欲食復不能食常默然欲卧不能卧欲行不能行飲食或有美

時或有不用聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形

如和其脈微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸差者四十日愈若溺快然但頭眩者二十

日愈其證或末病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨證治之

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之

此亦為逆

此等症病後得之者甚多醫者不知多方誤治以致病氣日深不可救療始終無一人能識之者過地皆然也

百合病方

百合知母湯

金匱 百合病發汗後者主之

別以泉水二升煎知母取一升去滓後合和煎取

滑石代赭湯

金匱 百合病下之後者主之

百合滑石

七枚 三兩 綿裹 代赭石 四兩 綿裹

水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫服

百合雞子湯

金匱 百合病吐之後者主之

百合雞子黃

一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓

百合地黃湯

金匱 百合病不經吐下發汗病形如初者主之

百合地黃汁

一枚 生地黄汁一斗

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓

百合洗方

金匱 百合病一月不解變成渴者主之

百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也

枯薑牡蠣散金匱 百合病渴不差者主之

枯薑根 牡蠣煅等 右為細末飲服方寸匕日三服

百合滑石散金匱 百合病變發熱者一作發熱主之

百合炙 滑石三兩 右為散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

感冒方附

九味羌活湯張元素方 四時發散

羌活 防風 川芎 白芷 細辛 蒼朮 黃芩 甘草 生地 右加生

薑三片葱白三莖水煎服此方感之總方惟生地不若易當歸為佳此方之外感之總方惟生地不若易當歸為佳此方

敗毒散活人書 治傷寒瘟疫風濕風眩拘攣風痰頭痛目眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼 白茯苓 桔梗 人參各一

甘草五錢 右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎七分溫服或沸湯點服煩熱口渴加黃芩

參蘇飲金匱 治感冒風寒頭痛發熱憎寒咳嗽涕唾稠黏胸膈滿悶脈弱無汗

人參 蘇葉 乾葛 前胡 陳皮 枳殼 茯苓 半夏各八 桔梗 木香

甘草各五 生薑五片 大棗一枚 右十三味水煎熱服取汗以上三方乃感冒風寒之總法其病在皮膚肌肉之中未入經絡故不

能傳變大段驅散太陽陽明之風寒足矣其有食者則兼用消食之品可也此等症四時皆有南方最多

寒熱

靈素

靈口問篇曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄

素逆調論黃帝問曰人身非常溫也非常熱也為之熱而煩滿者何也岐伯對曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何岐伯曰是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出帝曰人有四肢熱逢風寒如炙如火者何也岐伯曰是陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩陽相得而陰氣虛少水不能凌盛大而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風寒如炙如火者是人當肉爍也帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是為何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩大腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤臟也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨癰是人當蠱節也帝曰人之肉苛者雖近於衣絮猶尚苛也是為何病岐伯曰榮氣虛衛氣實也榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死

移熱移寒 素氣厥論黃帝問曰五臟六腑寒熱相移者何岐伯曰腎移寒於脾癰腫少氣脾移寒於肝癰腫筋攣肝移寒於心狂隔中心移寒於肺肺消飲一溲二死不治肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裏漿水之病也脾移熱於肝則為驚衄肝移熱於心則死心移熱於肺傳為鬲消肺移熱於腎傳為柔痙腎移熱於脾傳為虛腸辟死不可治胞移熱於膀胱則癰溺血膀胱移熱於小腸小腸不便上為口糜小腸移熱於大腸為虛痙為沉大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦胃移熱於膽亦曰食亦膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄衄目故得之氣也

難經

寒熱之病候之如何也然皮寒熱者皮不可近席毛髮焦鼻衄鼻得汗肌寒熱者皮膚痛唇口苦無汗骨

寒熱者病無所安汗注不休齒齬痛陽維為病苦寒熱

傷寒論

病人身大熱反欲近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

此種寒熱既非感冒亦非傷寒其淺深有皮膚骨髓之殊其久暫有歲月之異輕者有似感冒重者即變骨蒸所以內經以後諸書寒熱自有方論不八傷寒等法大段以清營中之熱為主其或有風有痰有積有痰者則隨症消息之可也

寒熱方

四時加減柴胡湯金治五臟寒熱

柴胡 白朮各八分大腹欖柳四枚并皮子用陳皮五分生薑五分桔梗七分以上冬三月柴胡稍多春三

月減白朮增枳實夏三月又增甘草仍用枳實白朮秋三月同冬三月惟陳皮稍多右各咬咀分為

三貼一貼以水三升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服渣再合煎一服治寒熱總不能外柴胡寒熱久者必有

積滯分讀去聲二錢半為一分

天行熱病方外臺療天行三日外至七日不歇內熱令人更相染者主大青消毒湯

大青四兩香豉八合乾葛綿裹梔子各四兩生地切芒硝三兩右六味切以水五升煮取二升

半去滓下芒硝分三服

一方有石膏八兩忌蕪蕪熱麴酒蒜等物此方專清陽明之熱

苦參湯金療天行熱病五六日以上宜服

苦參三兩黃芩二兩生地黃八兩右三味切以水八升煮取二升去滓溫服半升日再服忌蕪蕪

凝雪湯外臺療天行毒病七八日熱積胸中煩亂欲死

羌花一升 右一味以水三升煮取一升半漬故布薄胸上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆

也按本草羌花能治
蠱毒瘡胸中痰水

大黃湯外 療天行五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食

大黃胃黃連心肝黃柏腎梔子兩各半

升去滓分三服此許推然方神良又療傷寒已五六日頭痛壯熱四肢煩疼取汗並宜老小忌豬肉冷

也此三黃湯之變
能除六經之熱

桃葉重身法水一石煮桃葉取七斗以薦席自圍衣被蓋上安桃湯於牀簣下取熱自熏停少時當

雨汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈

有屬厥症不可勝舉其治法各詳於本病條
下當細審之此只錄時行熱病之數方耳

霍亂附轉筋

傷寒論

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名

霍亂自吐下又利止復更發熱也傷寒其脈微澀者本是霍亂今是傷寒卻四五日至陰經上轉入陰

必利本嘔下利者不可治也欲似大便秘而反失氣仍不利者屬陽明也便必鞭十三日愈所以然者經盡

故也下利後當便鞭則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈不愈

者不屬陽明也吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣也此霍亂是傷寒變症
與霍亂本症微別

病源

霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹

絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛者則先利心腹並痛者則吐利俱發披風而實者身發熱頭痛體疲而復吐利虛者但吐利心腹刺痛而已亦有飲酒食肉腥膻生冷過度因居處不眠或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷則不磨不磨則水穀不消化亦令清濁二氣相干脾胃虛弱便則吐利水穀不消則心腹脹滿皆成霍亂霍亂脈大可治微細不可治霍亂吐下脈微遲氣急劣口不欲言者不可治此霍亂之正病言之最詳乾霍亂者是令氣搏於腸胃致飲食不消但腹滿煩亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐利名為乾霍亂也霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也冷入於足之三陰三陽則腳轉筋入於手之三陰三陽則手轉筋隨冷所入之筋筋則轉轉者皆由邪冷之氣擊動其筋而移轉也按轉筋之病全圖有難尿白散一方附脚氣條下而轉筋之症不一有平時常轉筋者有霍亂而轉筋者并有轉筋入腹者當用木瓜吳茱萸等藥及外治湯熨之法以備選擇

霍亂轉筋方

五苓散 霍亂頭痛發熱多欲飲水者主之寒多不用水者理中丸主之二方俱傷寒論見諸治

理中丸 此是寒霍亂之方百不得一者也誤用者害不旋踵 加減法 若臍上築者腎氣動也去木加桂四兩 吐多去木加生薑三兩 下多者還用木 悸者

加茯苓二兩 渴欲得水者如木足前成四兩半 腹中痛者加人參足前成四兩半 寒者加薑成四

兩半 腹滿者去木加附子一枚 服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣服

霍亂轉筋入腹作極鹹鹽湯於槽中煖漬之則差針 又方 以醋煮青布搗腳膝冷復易之

又方 香蒿一把水煮令極濃服二三升即差青木香亦佳

廣濟高良薑湯外 治霍亂吐利轉筋入腹

高薑四兩桂心四兩

右二味以水七升煮取二升去滓分三服此亦治寒霍亂之方

霍亂轉筋入腹方外臺木瓜子根皮合煎湯服之

茱萸湯外臺療霍亂轉筋不止

吳茱萸一升甘草

乾薑各二兩乾薑兩也藜子一把亂髮燒桂心二兩

合去滓分溫三服

右六味以水七升煮取二升三

大法外臺

以手拘所患脚大母指當脚心急筋上七壯又灸當足大母指聚筋上七壯又灸足大母

指下約中一壯又灸湧泉入腹者灸臍左二寸十四壯又灸股中大筋上陰一寸轉筋四逆者

灸兩乳根黑際各一壯轉筋欲死者灸臍上一寸十四壯

霍香正氣散局方一元散蘇合香丸局方香薷飲局方見通治

症

金匱

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛症一作瘧太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔症太陽病發熱脈

沉而細者名曰瘧為難治太陽病發汗太多因致瘧夫風病下之則瘧復發汗必拘急瘧家雖身

疼痛不可發汗汗出則瘧病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張

者瘧病也若發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒其發其汗止其脈如蛇暴腹脹大者為欲解脈如

故反伏弦者瘧夫瘧脈按之緊如弦直上下行瘧病有灸瘡難治太陽病其症備身體強八然

脈反沉遲此為瘧太陽病無汗而小便反多氣上衝胸口噤不得語欲作剛症瘧為病胸滿口噤臥

不著席脚攣急不可齒

症方

括蔓桂枝湯金 太陽病其症備身體強八九然脈反沉遲此湯主之

括蔓根二兩 桂枝 芍藥各三兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二

溫三服取微汗汗不出食頃復飲藥法

麻黃加獨活防風湯金 治剛痊

麻黃 桂枝各一兩 藥三兩 甘草半兩 獨活 防風各一兩 右六味每服一兩水煎

此乃傷寒壞病之變有者其條則百藥一其

葛根湯金 太陽氣湯金 桂枝加葛湯金 小續命湯見中

瘧閉利淋

靈素

靈本輸篇三焦手少陽之脈入絡膀胱約下焦實則閉癰虛則遺溺 五味篇酸走筋多食之令人癰

素宣明五氣論膀胱不利為癰不約為遺溺 氣厥論胞移熱於膀胱則癰溺血 骨空論腎脈為病癰

痔遺溺

金匱

淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中 淋家不可發汗發汗則必便血 熱在下焦者則尿血亦

令淋秘不通 小便不利者有水氣其人若渴

病源

石淋 淋而出石也腎主水水結則化為石

氣淋 腎虛膀胱熱氣脹所為也

膏淋 淋而有肥狀似膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也

勞淋 熱淋之甚者則尿血心主血血之行身通遍經絡循環腑臟勞甚則散失其常經溢入胞而成血淋也

胞轉 其病狀臍下急痛小便不通是也或因小便應下而強忍之或為寒熱所迫此二者俱合水氣還

上氣於胞使胞屈別不得充張外水應入不得入內洩應出不得出外內相雜塞故令不通病至四五日乃有致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便急疾走或忍水入房皆令胞轉或胞落並致死數便為重絕不使為胞轉

尿床 小便乃水液之餘從膀胱入於胞夜卧則陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發於眠睡不覺尿出也

癰閉利淋方

括婁瞿麥金匱 小便不利者有水氣其人苦渴此主之

括婁根二兩 茯苓三兩 瞿麥三兩 附子一枚 瞿麥一兩 右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日

三服不知增至七八丸以便利腹中溫為知

滑石白魚散金匱 主小便不利

滑石二分 亂髮二分 白魚二分 右三味杵為散飲服半錢匕日三服

茯苓戎鹽湯金匱 小便不利主之

茯苓半斤 白朮二兩 戎鹽一升 右三味以水五升煮取三升溫三服

豬苓湯金 脈浮發熱渴欲飲水小便不利者主之

豬苓去皮 茯苓 阿膠 滑石

澤瀉略 右五味以水四升先煮四味取二升去滓內

膠烱消溫服七合日三服此蓄飲之症

治諸種淋方金

葵根八兩 茅根 石首魚頭口各三兩宜用頭中骨 甘草一兩 通草二兩 貝子五合 天麻根五兩 右七味

咬咀以水一斗二升煮取五升分五服日三夜二亦主石淋治石淋切

石葦散針 治血淋

石葦 當歸 蒲黃 芍藥 右四味各等分治下節酒服方寸匕日三

胞轉方千金 治丈夫女人胞轉不得小便八九日者

滑石一斤 寒水石一斤 葵子一斤 右三味以水一斗煮取五升盡服即利

療小便難方本事 治便難小腹脹不急治殺人

用葱白三斤細剉炒令熱以帕子裹分作二處更替運臍下即通

石葦散局 治膀胱有熱淋瀝不宣或尿如豆汁或便出砂石並治之

木通兩 石葦二兩 白朮 瞿麥 芍藥 葵子各三兩 當歸 甘草炙

王不留行 右為細末每服二錢小麥湯調下食前日二三服

藕蜜煎老 治老人淋病小便不利痛悶之極

藕汁五合 白蜜五合 生地黃汁一升 右相和微火煎之令如餲空心含半匙漸漸下飲食忌熱食

炙肉此方亦治血淋

治石淋方千金翼

車前子二升 絹袋貼以水八升煮取三升空腹頓服之須臾當下石子宿勿食服之良

治熱淋方千金翼 白茅根四斤 以水一斗五升煮取五升每服一升日三夜一

四汁飲 治熱淋小便赤澀疼痛

葡萄取自 生藕取汁 生地取汁 白蜜各五

牛膝膏 治死血作淋 右和勻先把一盞銀器石器內慢火熬沸不拘時溫服

桃仁去皮 歸尾各一兩 牛膝浸一服 赤芍

次空心服如夏月用涼水換此膏不壞 生地各一兩半 水十鍾微火煎至二碗入麝香少許分四

八正散寶鑑 治諸淋

瞿麥 梔子

篇蓄 大黃

滑石 木通

車前子

甘草各一錢

加燈心一

錢煎服

治小便失禁方針 以水三升煮雞腸取一升分三服

家韭子炒六兩 鹿茸四兩 酥炙肉苁蓉酒浸 牛膝酒浸 熟地

石斛 桂心 乾薑略一 右為末酒糊丸桐子大每服五十丸加至百丸食前鹽湯溫酒任

下小兒遺尿者多自胞寒亦陽氣不足也別作小兒服

夜多小便方千金翼 治膀胱冷故小便至夜獨多

雞腸五兩 羊腎一具 赤石脂六兩 龍骨三兩 肉苁蓉四兩 川連五兩 桂心二兩

右七味為

末每服方寸匕。日二服。五日中作羊腎炙一劑。十日外作羊腎。臘香味如常食飽與之。

豬肚丸 治小腹痛數

豬肚

一個蓮子一升同煮一船上去皮心焙乾為末

舶上茴香

五錢

破故紙

一兩鹽水炒

川棟子

酒炒去核一兩

母丁香

三兩

加桑螵蛸

一兩尤效。蜜丸。梧子大。每服五十丸。空心溫酒送下。

縮泉丸 治脾氣不足小便頻多

烏藥

益智仁各等

右二味為末。酒煮山藥糊丸。如梧子大。每服五十丸。空心鹽湯送下。方有覆盆子

治尿床針

取雞肚腔一具。并腸燒末。酒服。男。雌。女。雄。

威喜丸


親通

蒲葢散

龍腦雞蘇丸

治五淋血

蘭臺軌範卷三終



H87378h
1907
v. 6